

任意インフルエンザ予防接種 接種費用助成のお知らせ

【実施期間】 10月1日 ～ 翌年2月末日

予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、約5ヶ月間その効果が続きます。流行が始まる前の12月中旬までに接種を受けることをお勧めします。

【対象者】 満1歳以上～中学3年生の方

【助成額】 ○1歳～13歳未満の方：1回あたり2,000円 2回分を助成
○13歳～中学3年生：1回分 2,000円を助成

医療機関の実施金額との差額を医療機関へお支払いください。

※ 芳賀郡市外の医療機関の場合は、一旦料金を全額ご負担いただき、接種後に領収書を保健センターへ提出してください。

【申し込み】 医療機関へ事前に予約をしてください。保健センターへの申し込みは不要です。

接種の際には、かかりつけ医と相談し、体調の良い時に接種を受けましょう。



予防接種を控えたほうがいい方

- 37.5度以上の発熱がある方
- 急性の病気にかかっている方
- 卵を食べるとショックをおこす、全身にじんま疹が出たりするといった、強い卵アレルギーの方
- 今までにインフルエンザの予防接種で具合が悪くなったことのある方

副反応は？

インフルエンザの予防接種を受けた後、次の様な症状がでることがあります。

《接種直後》 ● 熱が出る、寒気がする ● 注射の跡が赤くなる、はれる、痛む ● 頭痛や全身のだるさ

《接種後数日から2週間以内》 ● 頭痛 ● けいれん ● 運動障害 ● 意識障害

これらの他に、非常にまれですが、ショックやじんま疹・呼吸困難などが現れることもあります。

このような症状がでた場合は、早目に接種した医療機関を受診して下さい。

接種後、注意すること

- ① 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師（医療機関）とすぐ連絡を取れるようにしておきましょう。
- ② 副反応の多くは24時間以内に出現します。特にこの間は体調の変化にご注意ください。
- ③ 入浴はできますが、注射したところは強くこすらないようにしてください。
- ④ 接種当日は、大量の飲酒や激しい運動は避けましょう。

うがいをしよう

手を洗おう!



【お問合せ】 保健センター TEL 70-1121